




شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران

[idc_1359](https://www.instagram.com/idc_1359/)
 [idc1359](https://www.linkedin.com/company/idc1359/)
 www.idc1359.ir

خبرنامه تعاونی دندانپزشکان ایران - اردیبهشت ۱۴۰۳



گزارش حضور تیم تعاونی دندانپزشکان ایران

در شصت و سومین کنگره بین المللی جامعه دندانپزشکی (اکسیدا ۲۰۲۴)

شصت و سومین کنگره بین المللی جامعه دندانپزشکی (اکسیدا ۲۰۲۴) و نمایشگاه مواد و تجهیزات دندانپزشکی به عنوان بزرگترین رخداد ایران در این حوزه، با حضور جمع کثیری از شرکتهای توانمند داخلی و خارجی، بزرگان و اساتید پرجسته دندانپزشکی در اردیبهشت امسال برگزار شد.

در این رویداد حدود ۵۰۰ متخصص شناخته شده ایران در زمینه دندانپزشکی به عنوان سخنران در کنگره بین المللی دندانپزشکی ایران (اکسیدا ۲۰۲۴) به ارائه آخرین دستاوردهای این حوزه پرداختند. و بیش از ۷ هزار متخصص دندانپزشکی به منظور بهروزرسانی دانش و آشنایی با آخرین پیشرفت های درمانی در حوزه تخصصی خود در کنگره اکسیدا ثبت نام کردند.

این رویداد، فرصت مغتنمی برای شرکت های فعال در زمینه محصولات و خدمات دندانپزشکی است تا محصولات و دستاوردهای خود را برای مخاطبین به نمایش بگذارند.





تیم شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران، به عنوان عضوی از جامعه‌ی دندانپزشکان کشور، در شصت و سومین کنگره بین‌المللی جامعه دندانپزشکی، از ۲۵ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ در غرفه A83/1 واقع در طبقه E ایرانمال تهران، حضوری فعال و موثر داشت و پذیرای بازدیدکنندگان خود بود. در این مدت ضمن معرفی بهتر شرایط خرید فروشگاهی وامکانات خرید از سایت در غرفه، استقبال خوبی از طرف همکاران بابت ثبت نام در سایت و ایجاد زمینه خرید آنلاین نیز صورت گرفت.



بررسی تأثیر درمان بیماری لته بر فیبریلاسیون دهليزی

فیبریلاسیون دهليزی، نوعی بیماری قلبی است که در آن ضربان قلب نامنظم است و خطر سکته تا پنج برابر افزایش پیدا می‌کند. تحقیقات جدیدی که اخیراً منتشر شده رابطه‌ی درمان این بیماری را با درمان بیماری لته بررسی می‌کند.

بر اساس تحقیقات جدید که اخیراً منتشر شده، درمان بیماری‌های لته بعد از سه ماه از درمان ریتم نامنظم قلب ناشی از فیبریلاسیون دهليزی (AFib)، ممکن است التهاب دهان را کاهش دهد و احتمال عود مجدد این بیماری را کاهش می‌دهد.

این تحقیق از اول آوریل ۲۰۲۰ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۲ در بیمارستان دانشگاه هیروشیما در هیروشیما ژاپن به عنوان اولین مطالعه در مورد تأثیر درمان بیماری لته بر فیبریلاسیون دهليزی انجام شد و ۲۸۸ بزرگسال آسیایی (۶۴٪ مرد، ۳۴٪ زن) تحت درمان AFib از مورد مطالعه قرار گرفتند.

۹۷ بیمار که تحت روش غیرجراحی ابليشن كتتر با فركانس راديويي و التهاب لته آنها نيز تحت درمان قرار گرفته و هم چنین ۱۹۱ بیمار بیماری لته آن ها درمان نشده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. پس از ابليشن، در دوره‌ی پيگيري بين ۸.۵ ماه تا ۲ سال، محققان دريافتند در ۲۴٪ از بيماران در طول دوره پيگيري، دفيبريلاسيون دهليزی مجدد اتفاق افتاده است. به علاوه احتمال عود AFib در بيماراني که التهاب شديد لته آنها پس از ابليشن كتتر قلب درمان شده، در مقاييسه با بيماراني که التهاب شديد لتهی آنها تحت درمان نگرفته، ۱۶ درصد کمتر بود. بیماری لته در افرادی با عود AFib، نسبت به بيماراني که در آن ها فیبریلاسیون دهليزی عود نکرده، شدیدتر بود.

ابتلا به بیماری لته، جنسیت موخت، تجربه ضربان قلب نامنظم برای بيش از دو سال و حجم دهليز چپ را می‌توان از عوامل پيش‌بيني‌كشند عود AFib دانست.

ميادچي سريپرست تيم تحقيق خاطر نشان کرد، شاخص کمی بیماری لته، معروف به سطح ملتهب پريودنتال يا PISA، می‌تواند در عملکرد قلب و عروق موثر است.

تعاونی دندانپزشکان ایران تنها تعاونی سراسری دندانپزشکان در ایران است. هدف از تاسیس تعاونی اثرباری در جهت کنترل بازار و تعیین عدالت در توزیع کالا است. شما می‌توانید مواد و تجهیزات دندانپزشکی را به صورت حضوری و یا از طریق سایت خریداری کنید.

ارسال رایگان روزهای دوشنبه و چهارشنبه

تهران برای مبالغ بالای ۱۲ میلیون تومان
و سایر شهرها برای مبالغ بالاتر از ۱۶ میلیون تومان

برای مشاهده محصولات و یا
خرید از طریق سایت، بارکد را
اسکن کنید



آینه‌های دندانی و روش نگهداری از آنها :

آینه‌های دندانی که به دندانپزشکان امکان معاينه مناطق مختلف دندان را می‌دهند، از جمله ابزار اصلی معاينه دندانپزشکی هر فرآيند درمان هستند.

این آینه علاوه بر ضدبخار بودن، می‌توانند یکبار مصرف یا قابل اتوکلاو باشند. این آینه‌ها باید به قدری کوچک باشند که بتوانند در دهان بیمار حرکت کنند و باعث راحتی کار دندانپزشک در حین درمان باشند.

آینه‌ی دندانپزشکی شامل دو قسمت سر آینه که معمولاً گرد است و دسته‌ی فولادی ضد زنگ که دندانپزشک هنگام بررسی دندان‌های بیمار و ساختارهای اطراف دهان آن را نگه می‌دارد.

سه کارکرد اصلی آینه دندانپزشکی شامل موارد زیر هستند:

(مشاهده مناطقی از دندان که به سختی قابل رویت هستند)
(عقب کشیدن بافت‌های نرم (عقب کشیدن گونه یا زبان برای دسترسی بهتر به دندان)
(بازتاب نور (برای مشاهده قسمت‌هایی از دهان که روشن نیستند)

انواع مختلف آینه دندانی :

قبل از انتخاب نوع آینه، مهم است که چندین جنبه را در نظر بگیرید تا بهترین انتخاب خود را انجام دهید.

ترد مخروطی (Tred Amerikai) از نوع آینه تخت بوده که رایج ترین هستند.

Simple Steam : ویژگی ترد اروپایی یا ترد ساده، روکش دار بودن آن‌ها است.

روش نگهداری از آینه های دندانی

اما تفاوت بین آینه های cone و simple steam چیست؟

سر آینه های cone socket دارای لبه قبل از ترد روی میله هستند، ولی سر آینه های simple steam دارای میله مستقیم هستند.

سایز آینه دندانپزشکی : simple steam
سایز آینه دندانپزشکی

سایز ۱: قطر ۱۴ میلی متر

سایز ۲: قطر ۱۸ میلی متر

سایز ۳: قطر ۲۰ میلی متر

سایز ۴: قطر ۲۲ میلی متر

سایز ۵: قطر ۲۴ میلی متر

دستورالعمل برای تمیز کردن و ضد عفونی صحیح آینه های دندانی :

مواد شوینده آنزیمی را روی آینه ریخته و آینه را با آب بشویید تا بزاق و خون تا حد امکان از بین برود.

آینه را با یک پارچه بدون پرز یا هوای فشار بالا، خشک کنید.

بررسی کنید تا مطمئن شوید عاری از هرگونه باقیمانده است.

آینه را در کیسه ضد عفونی کننده قرار دهید. می توانید آن را به صورت جداگانه یا همراه با سایر ابزارهای معاینه و تشخیصی بسته بندی کنید.

کیسه های آینه را با قرار دادن در اتوکلاو استریل کنید (این کار باید طبق توصیه های سازنده انجام شود).

آینه را در محیط های کنترل دما و رطوبت نگهداری کنید
از فشرده شدن و شکستگی کیسه ها جلوگیری کنید تا استریل بودن آینه تا لحظه استفاده تضمین شود.

بیمه‌ی درمان تکمیلی تعاوی دندانپزشکان ایران با بیش از ۱۵ سال قدمت همچنان در زمینه خدمات دهی به دندانپزشکان پیشتاز است.

تحفیفات ویژه‌ی دندانپزشکان، قیمت مناسب و بهترین پوشش بیمه‌ای کشور از جمله ویژگیهای این خدمات است.



زمان: ۲۴ و ۲۵ خرداد
از ساعت ۸/۳۰ تا ۱۴/۳۰

برای اطلاعات بیشتر بارکد را
اسکن کنید





شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران

www.idc1359.ir

 idc_1359

 idc1359

تهران، کوی نصر، خیابان شهید علیالی (پیروزی) غربی، شماره ۹۴۵



۰۲۱-۸۸۲۶۸۳۰۴ ۰۲۱ - ۸۸۲۶۸۳۰۵ ۰۲۱- ۸۸۲۶۸۳۰۹